

# TOHO Lab News

東邦微研ニュース



## 感染性胃腸炎が観測史上最大規模の流行に迫る！

この時期の感染性胃腸炎の患者はノロウイルスによるものが多いと言われています。

国立感染症研究所の昨年末の27日発表によると、

ノロウイルスなどの感染性胃腸炎が増加し1医療機関当たりの患者数が**全国平均20.89人**に上ったとのことです。

また、全国の小児科約3,000カ所からの報告をまとめた12月12～18日定点調査では、21都府県で警報レベルを超えたとのことです。

全国平均が警報レベルとなる20人を超えたのは、過去最大の流行であった平成18年以来的のことです。

さらに、一部の自治体で検出されたノロウイルスの大半は、過去に流行したGII.2の変異株であることが判明しており、現在市販のノロウイルス迅速診断検査キット（イムノクロマト法）では、他の株より感度が低い可能性があることも指摘されています。

ノロウイルスは患者の大便や吐物中に大量に含まれており、感染力が非常に強いウイルスです。

食中毒を防止するためには、手洗い（指先、指の間、爪の間、親指の周り、手首、手の甲をていねいに2度洗い）の励行を基本に、調理の加熱は中心温度85～90℃で90秒以上行うこと。

器具の消毒は熱湯（85℃で1分以上）か消毒剤（200ppmの濃度の塩素消毒液等）で行うことなどの注意が大切です。

ノロウイルスによる食中毒は、調理に従事した感染者の手指等を介した食品の二次汚染を原因とするものが大半であることから、調理従事者の健康チェックを徹底し、体調不良者は調理を含め食品を取扱う作業に従事しないことが重要です。

調理従事者にノロウイルス感染の疑いがある場合は、検査結果に関わらず食中毒防止対策等に努めて頂くことが肝要です。

検査内容、お見積りなど、お気軽に営業部までお問い合わせ下さい。



〒556-0001 大阪府大阪市浪速区下寺3-11-14 担当：営業部

TEL：06-6648-7157 FAX：06-6636-9266

E-Mail：[toholab@toholab.co.jp](mailto:toholab@toholab.co.jp) HP：<http://www.toholab.co.jp>

フリーメールアドレス(G-MailやYahoo mail等)には、社内セキュリティにより返信できません。

発信アドレスは、所属機関やプロバイダーのメールアドレスをご使用ください。

TOHO Biological Laboratories Co.,Ltd. ISO9001認証取得



### ■許認可・登録

- ・登録衛生検査所（微生物）
- ・建築物飲料水水質検査業
- ・環境計量証明事業登録
- ・厚生労働省登録水質検査機関
- ・温泉成分分析機関
- ・食品衛生法登録検査機関